INSECTES DU BENGALE.

(35e mémoire).

CLAVICORNES

par M. A. Grouvelle.

3me liste.

NITIDULIDÆ.

Carpophilus sericeus Mots., Kurseong.
— *bifenestratus* Murr., Kurseong.
— *fulvipes* Mots., Kurseong.
— *cribratus* Mots., Kurseong.

Epuræa (Micrurula) Braeti n. sp.

Ovata, convexa, subnitida, flavo-pubescens, testacea levissime infuscata, sat dense punctata; clava antennarum subinfuscata, 10° articulo 11° vix latiore; prothorace transverso, antice angustato, basin versus haud constricto, lateribus explanatis; elytris alutaceis, ad apicem truncatis.

♂. *Tibiis intermediis ad apicem intus vix dilatatis.* — Long. 3 mill.

Ovale, convexe, couvert d'une pubescence flave, peu longue et peu serrée, testacé très légèrement enfumé. Massue des antennes un peu rembrunie; dernier article terminé en bouton, à peine moins large que le précédent. Tête et prothorax assez brillants, ponctuation moins serrée sur le dernier, fond paraissant lisse avec les grossissements ordinaires. Prothorax transversal, rétréci régulièrement de la base au sommet, marge antérieure échancrée, latérales arquées, relevées; angles antérieurs arrondis, postérieurs subaigus. Écusson triangulaire, très nettement alutacé. Élytres très nettement alutacés, peu densement ponctués, moins brillants que le prothorax; ponctuation un peu rapeuse; bords latéraux étroitement rebordés; sommet subtronqué. Pygidium assez grossièrement ponctué.

Tibias intermédiaires du mâle à peine dilatés à l'intérieur au sommet.

Kurseong.

Epuræa (Micrurula) subtilis n. sp.

Ovata, convexa, nitida, alutacea, punctata, flavo-pubescens; 10° articulo antennarum 11° vix latiore; prothorace transverso, antice quam postice angustiore, angulis anticis subrotundatis, posticis obtusis, lateribus vix explanatis, margine antico truncato; elytris ad apicem subtruncatis. — Long. 1 mill. 3/4.

Ovale, convexe, brillant, alutacé, couvert d'une pubescence flave, couchée, assez longue et peu dense, assez fortement mais peu densement ponctué. Dernier article de la massue des antennes à peine plus large que le précédent. Une impression transversale arquée sur la tête, entre les yeux. Prothorax plus de deux fois plus large que long, beaucoup plus rétréci au sommet qu'à la base, bord antérieur tronqué, latéraux arqués, à peine explanés; angles antérieurs subarrondis, postérieurs obtus. Écusson en triangle curviligne. Élytres ovales, présentant leur plus grande largeur vers le milieu de la longueur, plus de deux fois plus longs que larges ensemble, subtronqués au sommet.

Kurseong.

Epuræa (Micrurula) cerina n. sp.

Ovata, convexa, subnitida, flavo-pubescens, cerina, alutacea, dense punctata; capite infuscato: 10° articulo antennarum 11° latiore; prothorace transverso, antice angustato, basin versus haud constricto, lateribus stricte explanatis; elytris ad apicem separatim subrotundatis.

♂. *Tibiis intermediis ad apicem intus dilatatis.* — Long. 3 mill.

Ovale, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave assez longue et peu serrée, finement alutacé, jaunâtre. Tête un peu enfumée, densement et fortement ponctuée; dernier article de la massue des antennes excavé, moins large que le précédent.

Prothorax transversal, densement et un peu moins fortement ponctué que la tête, rétréci régulièrement à partir de la base, marge antérieure échancrée, latérales arquées; angles antérieurs arrondis, postérieurs droits, bords latéraux étroitement relevés. Écusson triangulaire. Élytres près de deux fois et demie aussi longs que le prothorax, subarrondis séparément au sommet, plus fortement ponctués, mais moins densement que le prothorax; bords latéraux très étroitement relevés. Dernier segment de l'abdomen découvert, densement ponctué.

Tibias antérieurs du mâle faiblement arqués, intermédiaires, dilatés à l'intérieur au sommet.

Kurseong.

Soronia Braeti n. sp.

Ovata, convexa, vix nitida, flavo-pubescens, nigro- vel testaceo-setosa, testacea, brunneo-variegata, dense punctata; prothorace transverso, lateribus rotundatis, margine antico profunde emarginato, disco tuberculato; elytris lineato-setosis. — Long. 5 mill.

Ovale, environ deux fois et demie plus long que large, assez convexe, à peine brillant, couvert d'une pubescence flave, couchée, plus épaisse et plus dense sur la tête et sur le prothorax, plus fine sur les élytres, garni de soies dressées recourbées en arrière, noires ou testacées suivant la couleur du fond et disposées en lignes sur les élytres. Ponctuation très serrée. Tête rembrunie, plus claire en avant. Prothorax brun sur le disque, testacé sur les côtés, plus de deux fois plus large que long, plus rétréci au sommet qu'à la base, présentant sa plus grande largeur vers le quart à partir de la base; bords latéraux régulièrement arrondis, bord antérieur rebordé de chaque côté, profondement et largement échancré, milieu de l'échancrure un peu saillant sur la tête, tronqué; angles antérieurs saillant en avant, subarrondis, postérieurs obtus; sur le disque quelques petits tubercules disposés en partie en ligne longitudinale de chaque côté du milieu qui semble par suite sillonné. Écusson en triangle curviligne, plus large que long. Élytres trois fois plus longs que le prothorax, testacés, variés de brun.

Kurseong.

Voisin de *S. grisea* Lin. mais plus fortement ponctué, plus pubescent et d'une couleur générale beaucoup plus claire.

Prometopia setosula n. sp.

Ovata, convexa, subnitida, griseo-pubescens, setosula, fusco-testacea; capite rugose punctato; prothorace transverso, quadrato. punctato, lateribus dense varioloso-punctatis, margine antico emarginato, medio leviter producto, basi medio subemarginato, elytris conjunctim rotundatis, dense punctatis. — Long. 4 mill.

Ovale, convexe, peu brillant, brun clair, couvert d'une pubescence gris clair, très fine et peu serrée et garni de soies courtes, inclinées en arrière, flaves claires sur le devant du corps, plus blanches sur l'arrière. Tête rugueusement ponctuée. Prothorax quadrangulaire, un peu rétréci au sommet, un peu plus de deux

fois plus large que long; disque éparsement ponctué, intervalles des points avec quelques points beaucoup plus petits, côtés du prothorax densement ponctués, ponctuation rugueuse et varioleuse; bord antérieur sinué de chaque côté du milieu; base largement échancrée dans le milieu, finement retordée; bords latéraux légèrement explanés; angles antérieurs saillants en avant, subrectangulaires. Écusson triangulaire beaucoup plus large que long. Élytres environ deux fois aussi longs que le prothorax, densement ponctués, ponctuation plus dense et plus forte sur les côtés, arrondis ensemble au sommet, soies dressées irrégulièrement disposées.

Barway.

Parametopia indica n. sp.

P. concolori *Grouv. simillima, sed latior et minus nitida; in elytris alicuibus vestigiis striarum et macula discoidali, ovata, nigra, claro circumcincta.* — Long. 4 mill.

Très voisin de *P. concolor* Grouv., mais un peu moins brillant et plus large. Sur chaque élytre quelques vestiges de stries et une tache discoidale placée près du milieu de la longueur, ovale, noirâtre, entourée d'une bordure plus claire qui fait ressortir sa teinte foncée sur le fond brun clair de l'élytre.

Kurseong.

Pria indica n. sp.

Oblonga, convexa, subnitida, flavo-pubescens, nigricans; antennis, pedibus margine antico capitis et marginibus reflexis prothoracis rufis; capite dense punctato; prothorace transverso, antice angustato, lateribus rotundatis, margine antico subtruncato; elytris ad apicem truncatis.

♂. *Clava antennarum* 4. *articulata.* — Long. 2 1/3 mill.

Oblong, convexe, faiblement brillant, couvert d'une pubescence flave fine couchée, assez dense bien que ne masquant en rien le tégument, noir olivâtre. Antennes sauf la massue testacées. Tête densement et assez fortement ponctuée, marge antérieure rougeâtre. Prothorax transversal, rétréci au sommet; bords latéraux régulièrement arqués, antérieur subtronqué; angles antérieurs arrondis, postérieurs droits; marges latérales explanées; ponctuation dense, plus fine que celle de la tête. Écusson ogival. Élytres deux fois aussi longs que le prothorax, tronqués et bordés d'un fin liseré rouge au sommet, densement et finement ponctués. Pygidium finement ponctué. Pattes rougeâtres.

♂. Massue des antennes de 4 articles, le premier moins large que les suivants.

Kurseong.

Espèce voisine de *P. dulcamara* Scop., mais de coloration plus foncée. Le *P. indica* est plus densement ponctué et ses élytres sont proportionnellement plus acuminés au sommet.

Pria apicalis n. sp.

Ovato-elongata, subconvexa, subnitida, alutacea, dense flavo-pubescens, leviter infuscata; prothorace utrinque in longitudinem, elytris circa scutellum et ad apicem testaceis; 11° articulo antennarum 10° angustiore; prothorace transverso, antice angustato, dense punctato, angulis anticis posticisque rotundatis, lateribus stricte explanatis; elytris dense punctulatis, apice producto, lateribus stricte explanatis, stria suturali antice haud impressa; tibiis anticis denticulatis, denticulo ultimo prominulo, tibiis intermediis posticisque compressis, latissimis. — Long. 2 mill. 1/4.

Ovale allongé, subconvexe, assez brillant, alutacé, couvert d'une pubescence flave, couchée et serrée, testacé un peu enfumé, plus clair de chaque côté du disque du prothorax, à la base des élytres autour de l'écusson et au sommet sur la marge apicale. Massue des antennes rembrunie; dernier article un peu plus étroit que le précédent. Tête densement ponctuée. Prothorax un peu moins de deux fois plus large, dans sa plus grande largeur, que long, retréci en avant, densement ponctué, ponctuation moins forte que celle de la tête; marge antérieure presque tronquée, postérieure bi-sinuée de chaque côté; tous les angles arrondis; bords latéraux étroitement explanés. Écusson densement ponctué, presque demi-circulaire. Elytres presque deux fois aussi longs que larges, séparément acuminés au sommet, densement ponctués; strie suturale bien marquée au sommet, atténuée à la base. Bord externe des tibias antérieurs finement denticulé, denticules plus marqués dans la partie apicale, dernier denticule plus saillant, en forme d'ongle. Tibias intermédiaires et postérieurs très larges, comprimés.

Kurseong.

Pria plagiata n. sp.

Elongato-ovata, subconvexa, subnitida, alutacea, dense punctillata, flavo-pubescens, rufo-testacea, leviter infuscata; clava basique antennarum, pedibusque dilutioribus; elytris plaga discoidali excepta infuscatis; 10° articulo antennarum 11° vix latiore; pro-

thorace transverso, antice angustato, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis, lateribus stricte explanatis; elytris ad apicem subtruncatis; tibiis compressis latis; segmento abdominali maris pygidio occulto. — Long. 1 mill. 3/4.

Ovale, allongé, subconvexe, un peu brillant, alutacé, densement pointillé, couvert d'une pubescence flave claire, dense, assez fine, roux testacé légèrement enfumé; massue, base des antennes et pattes plus claires. Dernier article de la massue des antennes à peine plus étroit que le précédent. Prothorax un peu plus de deux fois plus large à la base que long, rétréci en avant; angles antérieurs largement arrondis, postérieurs obtus; bord antérieur tronqué, base sinuée de chaque côté, bords latéraux étroitement explanés. Écusson en triangle curviligne. Élytres environ deux fois aussi longs que le prothorax, atténués vers le sommet, enfumés; sur le disque une tache allongée, oblique, plus claire; sommet subtronqué; à la base, de chaque côté de l'écusson, en face de la sinuosité de la base du prothorax, une impression ponctiforme; strie suturale marquée vers le sommet. Tibias comprimés, larges. Segment supplémentaire du mâle caché par le pygidium.

Kurseong.

Voisine de *P. pallidula* Er.

Meligethes Braeti n. sp.

Ovatus, convexus, nitidus, ater; antennis primo articulo clavaque exceptis rufis; margine antico capitis sinuato; prothorace transverso, antice angustato, dense punctato; elytris basin versus prothorace haud latioribus, fortiter punctatis, ad apicem separatim subrotundatis; tibiis anticis extus irregulariter serratis. — Long. 2 mill. à 2 1/2 mill.

Ovale, convexe, noir, brillant, couvert d'une pubescence grise peu fournie. Antennes sauf le premier article et la massue rougeâtres. Tête densement ponctuée, marge antérieure sinuée. Prothorax environ deux fois aussi large à la base que long, rétréci en avant; bords latéraux étroitement relevés, arqués surtout vers le sommet; ponctuation un peu plus forte et un peu moins dense que celle de la tête. Écusson tronqué au sommet, ponctué sur les côtés. Élytres pas plus larges à la base que le prothorax, ovales, subarrondies séparément au sommet; ponctuation plus forte que celle du prothorax. Tibias antérieurs armés à leur bord interne de plusieurs dents étroites séparées par des dents plus courtes, égales et très serrées.

Kurseong.

Meligethes Cardoni n. sp.

Ovatus, convexus, nitidus, pubescens, dense punctatus, fusco-castaneus; margine antico capitis emarginato; prothorace transverso, antice angustato; elytris ad apicem subtruncatis; tibiis anticis extus irregulariter spinosis. — Long. 3 1/2 mill.

Ovale, convexe, brillant, densement et fortement ponctué, très finement pubescent, marron un peu foncé. Épistome échancré. Prothorax environ deux fois aussi long que large à la base, très rétréci en avant; angles antérieurs largement arrondis, postérieurs obtus. Écusson tronqué, très finement alutacé. Élytres de la largeur du prothorax à la base, une fois et demie aussi long que lui, atténués vers le sommet et subtronqués; angles suturaux obtus. Pattes et antennes rougeâtres. Tibias antérieurs irrégulièrement dentés sur les deux tiers apicaux; premier denticule, en partant de la base, assez large, le deuxième également large, plus saillant, 3 et 4 épineux, moins saillants, 5 un peu plus large, plus saillant, 6 à 8 également plus larges et moins saillants, les derniers vers le sommet peu marqués.

Barway.

Circopes indicus Mots.

Circopes marginatus n. sp.

Ovatus, convexus, subnitidus, griseo-pubescens, ater; antennis, clava excepta, bucca, lateribus prothoracis pedibusque rufo-testaceis; fronte tuberculato; prothorace transverso, antice angustato, dense punctato, lateribus rotundatis, stricte explanatis; scutello ad apicem truncato; elytris lineato-punctatis, ad apicem separatim rotundatis. — Long.

Ovale, convexe, assez brillant, couvert d'une pubescence grise couchée assez dense, noir. Antennes sauf la massue, bouche, marges latérales du prothorax et pattes rouxtes-tacées. Tête fortement ponctuée, sur le disque une élévation lisse. Prothorax environ deux fois aussi large que long, deux fois plus large à la base qu'au sommet, bords latéraux arqués, base rebordée; ponctuation assez forte et assez serrée. Écusson tronqué au sommet. Élytres de la largeur du prothorax à la base, d'un tiers environ plus longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet, ponctués en lignes assez serrées. Une rangée de gros points enfoncés à la base du pygidium.

Kurseong.

Macroura dubia Grouv., Barway.

Macroura pusilla n. sp.

Ovata, convexa, subnitida, alutacea, subrugose parceque punctata, nigra; antennis pedibusque rufo-testaceis; prothorace tranversissimo; elytris ad apicem subtruncatis. — Long. 2 1/4 mill.

Ovale, assez large, peu brillant, pubescent, finement chagriné, peu densement ponctué, noir, pattes et antennes testacées rougeâtres. Ponctuation de la tête plus forte que celle du prothorax. Celui-ci plus de deux fois plus large à la base que long, rétréci en avant, bords latéraux étroitement relevés. Écusson triangulaire. Élytres un peu plus de deux fois plus longs que le prothorax, subtronqués au sommet; angles suturaux arrondis. Poitrine assez fortement et assez densement ponctuée.

Kurseong.

Distincte des autres espèces du genre par sa petite taille et par la sculpture finement chagrinée de son tégument.

Æthina vicina n. sp.

Ovata, lata, convexa, nitida, flavo-pubescens; antennis rufo-testaceis, clava obscuriore, 11° articulo 10° latiore; capite prothoraceque dense punctatis, nigris; elytris castaneis, micantibus; pygidio rufo-infuscato; pedibus rufo-testaceis; segmentis abdominis rufis. — Long. 3 1/2 mill.

Ovale, large, convexe, brillant, convert d'une pubescence jaune dorée, couchée très dense sur la tête, le prothorax et la base des élytres. Antennes d'un roux testacé, massue brunâtre, formée d'articles courts et serrés, dernier article plus large que le précédent. Tête et prothorax noirs, densement ponctués. Prothorax un peu plus de deux fois plus large à la base que long, très rétréci en avant; sommet échancré, bords latéraux régulièrement arrondis, étroitement relevés. Écusson tronqué au sommet. Elytres de la largeur du prothorax à la base, aussi longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet, presque subtronqués, marron avec un reflet métallique, densément ponctués. Pygidium rembruni, une ligne de gros points enfoncés à la base. Pattes d'un roux testacé. Segments de l'abdomen rougeâtres.

Kurseong.

Pallodes Cardoni n. sp.

Ovatus, convexus, glaber, brunneo-castaneus, limbo prothoracis basique elytrorum paulo dilutioribus; prothorace transverso,

antice angustato, parce punctato, basi medio producto; elytris ad apicem conjunctim rotundatis, lineato-punctatis. — Long. 3 1/2 mill.

Ovale, convexe, glabre, brun-marron; bords du prothorax et base des élytres un peu plus clairs. Tête et prothorax éparsement ponctués. Prothorax environ d'un tiers aussi long que large à la base, très rétréci en avant; bord antérieur échancré, latéraux faiblement arrondis, base saillante en arrière devant l'écusson; angles antérieurs et postérieurs arrondis. Écusson en triangle curviligne. Élytres de la largeur du prothorax à la base, un peu élargis, puis atténués et arrondis ensemble au sommet, ponctués en lignes; intervalles irrégulièrement et plus finement ponctués. Antennes et pattes marron clair.

Barway.

Cryptarcha Feæ Grouv., Barway.

La coloration de cette espèce varie du roux ferrugineux au noir.

TEMNOCHILIDÆ.

Alindria parallela Leveillé, Barway.
Melambia funebris Reitt., Barway.

COLYDIIDÆ.

Colobicus parilis Pasc., Barway.
Dastarcus indicus Fairm., Barway.

CUCUJIDÆ.

Hectarthrum heros Fab., Barway.
Prostomis morsitans Pasc., Barway.

PARNIDÆ.

Stenelmis Cardoni n. sp.

Elongata, parallela, nigricans; antennis clava excepta, unguiculis testaceis; capite prothoraceque pube brunnea densissima vestitis, hoc subelongato, in longitudinem sulcato, sulco antice evanescente, utrinque basin versus carinula brevi; elytris pube ochracea densissima vestitis, ad apicem conjunctim acuminatis; intervallis striarum haud elevatis. — Long. 4 mill.

Allongé, parallèle, noirâtre, couvert d'une pubescence feutrée très serrée noirâtre sur la tête et le prothorax, ochracée sur les

élytres. Antennes testacées, rembrunies au sommet. Tête et prothorax avec de très fines granulations brillantes, espacées et non masquées par la pubescence. Prothorax à peine plus long que large à la base, bisinué sur les côtés, rétréci régulièrement vers le sommet; sur le disque un sillon longitudinal partant de la base, et n'atteignant pas le sommet, de chaque côté contre la base une fine carène, contre les bords latéraux de chaque côté trois impressions dont la première contre le sommet dessine un commencement de bourrelet transversal. Écusson acuminé au sommet, arrondi sur les côtés. Élytres un peu plus larges que le prothorax, deux fois et demie aussi longs que larges, acuminés ensemble au sommet, ponctués striés, intervalles à peine relevés à la base. Pattes noirâtres, ongles testacés.

Barway.

Espèce voisine de *S. testacea* Grouv. mais plus grande; prothorax plus allongé, etc., etc.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DES *OCLADIUS* D'EUROPE ET CIRCA,

par M. Pic.

Les *Ocladius*, genre créé par Schönherr (Disp. Méth. 1826, p. 316) sont des Coléoptères *Rhyncophores* ordinairement rares dans les collections, se rangeant dans le voisinage du petit genre *Orobitis* Germ. bien connu de tous. Consulter pour l'étude de ces insectes les deux auteurs suivants :

Schönherr, in Genera Curculion., vol. IV, p. 696 et suivantes.

H. Tournier, in Petites Nouvelles, n° 199 (1875), pages 475 et 476.

0. Prothorax noir. Taille grande. 1

— Prothorax rouge ferrugineux, subsillonné longitudinalement. Taille plus petite. Élytres à ponctuation fine et superficielle, même sur les côtés. Long. 2 2/3 à 3 1/2 mill. Larg. 1 1/3 à 1 1/2 mill. Mésopotamie, Arabie (Jeddah).
rufithorax Trn. in litt.

1. Élytres parés de bandes ou taches claires 2

— Élytres unicolores, d'un noir brillant. Tête rougeâtre, prothorax lisse, orné d'une ponctuation allongée, écartée, plus profonde sur les côtés. Long. 4 mill. Larg. 2 1/2 mill. Algérie (Bou Saada) . . . . . *holomelas* Frm.